

# Complicațiile operațiilor pentru hipospadias; Disfuncțiile sexuale și rolul chirurgiei reconstructive uretrale la adultul tânăr

Valentin Voinescu



**Introducere:** Hipospadiasul este o malformație congenitală a uretrei care constă în deschiderea uretrei la exterior, între vârful glandului (unde este situat în mod normal) și perineu (anterior de anus). Această malformație afectează unul din 300 de nou-născuți de sex masculin. Corectarea este recomandat să se facă între 6 și 18 luni de către chirurgul pediatru. Operațiile pentru hipospadias sunt grevate fie de eșecul corecției, fie de complicații uretro-peniene care, nerezolvate până la vârsta adolescenței, vor avea repercusiuni majore asupra debutului și desfășurării ulterioare a vieții sexuale.

**Obiective:** Evaluarea impactului pe care metodele moderne de chirurgie reconstructivă uretrală îl au asupra debutului și calității vieții sexuale a tinerilor cu sechele uretro-peniene după multiple operații pentru hipospadias.

**Material și metodă:** În perioada septembrie 1999 – februarie 2006 au fost operați pentru complicații după multiple operații pentru hipospadias 26 pacienți cu vârste cuprinse între 4 și 72 ani. Dintre aceștia, 16 pacienți cu vârste cuprinse între 16 și 32 ani (media 23 ani) prezentau disfuncții sexuale de natură psihologică și organică legate de complicațiile uretro-peniene rezultate în urma operațiilor anterioare.

**Rezultate:** Postoperator, după rezolvarea leziunilor uretrale, a corecției hipospadiasului și realizarea unui aspect estetic rezonabil al penisului, toți pacienții și-au rezolvat sau sunt pe cale să își rezolve problemele de disfuncție sexuală.

**Concluzii:** Metodele moderne de chirurgie reconstructivă uretrală oferă pacienților cu sechele uretro-peniene rezultate în urma multiplelor operații pentru hipospadias, șansa de a avea o viață sexuală normală, prin corectarea leziunilor și obținerea unui aspect estetic penian care să se integreze într-o bună imagine corporală.